

Beste patiënt,

U heb op afspraak voor het plaatsen van implantaten.

Bij deze brief vindt u voorschrift voor de medicatie die u dient te nemen voor en na de behandeling volgens onderstaand schema:

| | avond ervoor | 1 uur voor ingreep | dag van ingreep | dag erna | 2 dagen erna | 3 dagen erna |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Antibiotica | | 2 pillen samen | | 2 per dag | 2 per dag | 2 per dag |
| Ontstekingsremmer | 1 s'avonds bij eten | | 3 per dag | 3 per dag | 3 per dag | indien nodig |
| Angstremmer | | indien nodig | | | | |
| Mondspoelmiddel | 2x/dag 1wk vr ingreep | | 2 x per dag | 2x per dag | 2x per dag | 2x per dag |

Hoe zal het verlopen?

De implantaten worden geplaatst onder lokale verdoving in een daarvoor speciaal ingericht tandartskabinet. Uw kleren en mond worden afgedekt met speciale steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Dit komt wat onwennig over het zal de genezing en de ingroei van de implantaten bevorderen.

Op het einde van de behandeling krijgt u een pijnstiller een een ijspak om tegen de wang te houden om zwelling te minimaliseren. Dit mag thuis nog herhaald worden gedurende 15 min elk uur gedurende 6u na de behandeling.

Indien u een prothese draagt wordt u aangeraden deze uit te laten gedurende enkele dagen.

Zal het pijn doen?

Zeker niet tijdens de behandeling zelf. Na de behandeling kan gedurende enkele dagen een minieme tot matige pijn zijn. Dit is afhankelijk van de persoon, lokatie, aantal en type implant.

Moet ik zwelling verwachten?

Zwelling is mogelijk en normaal. Dit is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van persoon tot persoon. De maximale zwelling wordt na 2 dagen bereikt. Ga niet teveel liggen en slaap met extra kussen.

Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

U krijgt een afspraak 7 tot 10 dagen na de ingreep.

Enkele Raadgevingen:

Een beetje **nabloeden** (sijpelen) is mogelijk de dag van de ingreep. Gebruik eventueel gaascompressen wanneer de bloeding aanzienlijk is. Indien nodig, wordt een compres nat gemaakt met koud water en vijftien minuten tussen de tanden geklemd. Meestal stopt zo de bloeding vrij snel.

Uitwendige ijscompressen zijn alleen de dag van de ingreep nuttig (gedurende vijftien minuten en enkele malen herhalen). Zij zullen de zwelling en dus ook pijn minimaliseren. U wacht best met eten en drinken totdat de verdoving volledig is uitgewerkt. Gebruik liefst koude of lauwe dranken en halfvloeibare of malse voeding de eerste dag.

Best is het om niet te roken noch alcohol te gebruiken gedurende enkele dagen.

Het **proper houden van de mond** is onontbeerlijk voor een goede genezing.

Na een chirurgische ingreep is het noodzakelijk het ontsmettende **mondspoelmiddel Perio Aid 0.12%** te gebruiken. U moet gedurende één week 's morgens en 's avonds met het product spoelen. Nadat U de niet-geopereerde zijdes normaal gepoetst heeft, spoelt U met 1 soeplepel onverdund product gedurende 1 minuut .

Wanneer ons zeker contacteren: 03/238.25.78 9u-17u

- Nabloeding stopt niet (lichte sijpeling gedurende 24u is normaal)
- Zwelling neemt nog toe na 48u
- Pijn neemt toe na 48u
- Lip voelt nog raar aan na 48u
- Koorts loopt om tot 39°C
- U hebt problemen met slikken en ademhaling